

## (cs) Vermophyt sirup

Působení přípravku je založeno na kombinaci aktivních látek herbálního původu. Přípravek obsahuje extrakty ze semen tykev obecné (*Cucurbita pepo*) a kořenů omanu pravého (*Inula helenium*), silice saturejky záhradní (*Satureja hortensis*), hřebíčkovce vonného (*Syzygium aromaticum*) a tymiánu obecného (*Thymus vulgaris*) a semena černuchy seté (*Nigella sativa*).

Přítomnost parazitických cizopasníků – roup dětský (*Enterobius vermicularis*), škrvka dětská (*Ascaris lumbricoides*) – se v gastrointestinálním traktu projevuje nejčastěji různě intenzivním svěděním v okolí konečníku případně pochvy. Méně často se vyskytují projevy žaludeční nevolnosti až ztráty chuti k jídlu, podráždenost, neklid a nespavost.

Vajíčka parazitů mohou přežít až dva týdny na oblečení, ložním prádle nebo jiných předmětech. Infekce vzniká, pokud jsou tato vajíčka náhodně požitá. Venujte proto již během doby používání preparátu zvýšenou pozornost dodržování správné osobní hygieny (mytí rukou apod.) a hygieny v domácnosti (používání čistého ložního prádla atd.).

### Obsah v 6 ml suspenze

Tykev obecná ( <i>Cucurbita pepo</i> ), extrakt z 1,2 g semen .....	100 mg
Černucha setá ( <i>Nigella sativa</i> ), semena.....	20 mg
Oman pravý ( <i>Inula helenium</i> ), extrakt z 65 mg kořene.....	15 mg
Saturejka záhradní ( <i>Satureja hortensis</i> ), silice.....	4,2 mg
Hřebíčkovec vonný ( <i>Syzygium aromaticum</i> ), silice .....	2,4 mg
Tymián obecný ( <i>Thymus vulgaris</i> ), silice.....	0,5 mg


Vodný roztok sorbitolu (Sorbitol sol. 70%), Voda (Aqua), Hydroxypropylmethylcelulóza (HPMC), Pomerančová silice (*Citrus aurantium* peel oil expressed), Sodná sůl sacharín (Sodium saccharin), Benzoan sodný (Sodium benzoate), Sorban draselň (Potassium sorbate)

**Přírodnaté látky:** oxid kremičitý (E 551), stearan hořčatný (E 470 b), glycerol (E 422).

**Doporučené dávkování:** Děti 3 – 5 let 1x denně 3 ml. Děti 6 – 12 let 1x denně 6 ml. Užívat po dobu 5 dnů, 30 minut před jedlem. **Protrépat před každým použitím.** Zapíť dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe neslazeného čaje nebo vody. Nepoužívejte přípravek dříve než 10 dnů od skončení posledního užívání. **Po 14 dnech kúru zopakujte.**

### Příprava perorální suspenze:

a) Uchopte lahvičku „A“ a nasadte ji na lahvičku „B“. Roztok z lahvičky „A“ přelijte do lahvičky „B“.



b) Řádně protřepete lahvičku „B“. Tako připravenou suspenzi v lahvičce „B“ uchovávejte při teplotě 5 – 12 °C.

**Upozornění:** Přípravek není vhodný pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Přípravek se neužívá při známé precitlivosti na některou složku přípravku. Jestliže zpozorujete reakce, které mohou být způsobené precitlivostí při užívání přípravku (zejména kopírkva nebo zarudnutí pokožky), přerušte ihned jeho užívání. Pokud se známky hypersenzitivnosti vyskytly, znovu již přípravek neužívejte. Přípravek neovlivňuje vaše schopnosti při řízení dopravních prostředků a při obsluze strojů.

Neotevřený přípravek uchovávejte v suchu při teplotě 5 – 25 °C. Po otevření uchovávejte při teplotě 5 – 12 °C a používejte nejdéle 20 dní od přípravy suspenze. Uchovávejte v původním obalu. Ukládejte mimo dosah dětí. Výrobek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Neprekračujte doporučené denní dávkování.

 ENEO Pharmaceuticals s. r. o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice,  
Česká republika, e-mail: info@eneo.cz

**Obsah:** 4 g prášku a 60 ml roztoku pro přípravu perorální suspenze.

Doplňek stravy

C-400-217-17-CZ-R3

## (sk) Vermophyt sirup

Pôsobenie prípravku sa zakladá na vyváženej kombinácii aktívnych látok herbálneho pôvodu. Prípravok obsahuje extrakty zo semien tekvice obyčajnej (*Cucurbita pepo*), z kořenového omanu pravého (*Inula helenium*), silice saturejky záhradnej (*Satureja hortensis*), klinčekovca voňavého (*Syzygium aromaticum*), tymiánu obyčajného (*Thymus vulgaris*) a semena černuchy setej (*Nigella sativa*). Prítomnosť parazitických cudzopasníkov – mŕľa detského (*Enterobius vermicularis*), škrvka detská (*Ascaris lumbricoides*) – sa v gastrointestinálnom trakte prejavuje najčastejšie rôzne intenzívny svrbenia v okolí konečníka pripadne pošvy. Menej často sa vyskytujú prejavy žalúdočnej nevoľnosti až straty chuti do jedla, podráždenosť, nepokoj a nespavosť.

Vajíčka parazitov môžu prežiť až dva týždne na oblečení, posteľnej bielizeň alebo iných predmetoch. Infekcia vzniká, ak sú tieto vajíčka náhodne požité. Venujte preto už počas doby používania prípravku zvýšenú pozornosť dodržiavania správnej osobnej hygieny (umývanie rúk a pod.) a hygieny v domácnosti (používanie čistej posteľnej bielizeň atď.).

### Obsah v 6 ml suspenzie

Tekvice obyčajnej ( <i>Cucurbita pepo</i> ), extrakt z 1,2 g semien.....	100 mg
Černucha setá ( <i>Nigella sativa</i> ), semena.....	20 mg
Oman pravý ( <i>Inula helenium</i> ), extrakt z 65 mg kořene.....	15 mg
Saturejka záhradná ( <i>Satureja hortensis</i> ), silica.....	4,2 mg
Klinčekovec voňavý ( <i>Syzygium aromaticum</i> ), silica .....	2,4 mg
Tymián obyčajný ( <i>Thymus vulgaris</i> ), silica.....	0,5 mg


Sorbitol sol. 70% (vodný roztok sorbitolu), Voda (Aqua), Hydroxypropylmethylcelulóza (HPMC), Pomerančová silica (*Citrus aurantium* peel oil expressed), Sodná sůl sacharín (Sodium saccharin), Benzoan sodný (Sodium benzoate), Sorban draselň (Potassium sorbate)

**Prirodňaté látky:** oxid kremičitý (E 551), stearan hořčatný (E 470 b), glycerol (E 422).

**Odporúčané dávkovanie:** Deti 3 – 5 rokov 1x denne 3 ml. Deti 6 – 12 rokov 1x denne 6 ml. Užívať po dobu 5 dní, 30 minút pred jedlom. **Pretrepať pred každým použitím.** Zapíť dostatočným množstvom tekutiny, najlepšie neslazeným čajom alebo vodom. Nepoužívať prípravok skôr než 10 dní od skončenia posledného užívania. **Po 14 dňoch kúru zopakujte.**

### Priprava perorálnej suspenzie:

a) Uchopte fláštičku „A“ a nasadte ju na fláštičku „B“. Roztok z fláštičky „A“ prelejte do fláštičky „B“.



b) Riadne pretrepte fláštičku „B“. Tako pripravenú suspenzi vo fláštičke „B“ uchovávajte pri teplote 5–12 °C.

**Upozornenie:** Prípravok nie je vhodný pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Prípravok sa neužíva pri známej precitlivosti na niektorú zložku prípravku. Ak spozorujete reakcie, ktoré môžu byť spôsobené precitlivosťou pri užívaní prípravku (najmä žihľavka alebo červenanie pokožky), prerušte ihned jeho užívanie. Pokiaľ sa známky hypersenzitivnosti vyskytly, znovu již prípravok neužívejte. Prípravok neovplyňuje vaše schopnosti pri riadení vozidla a pri obsluhe strojov.

Neotevrený prípravek uchovávajte v suchu pri teplote 5 – 25 °C. Po otvorení uchovávajte pri teplote 5 – 12 °C a používať najdlhšie 20 dní od prípravy suspenzie. Uchovávajte v pôvodnom obale. Ukládajte mimo dosah dětí. Výrobok nie je určený na používanie ako náhrada pestrej stravy. Neprekračovať doporučené denné dávkovanie.

 ENEO Pharmaceuticals s. r. o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice,  
Česká republika, e-mail: info@eneo.cz

**Obsah:** 4 g prášku a 60 ml roztoku na prípravu perorálnej suspenzie.

Výživový doplnok

C-400-217-17-CZ-R3

## EN Vermophyt syrup

The effect of this product is based on a combination of active substances of herbal origin.

The product contains extracts of Field pumpkin seeds (*Cucurbita pepo*) and elecampane root (*Inula helenium*), essential oils of summer savory (*Satureja hortensis*), clove (*Syzygium aromaticum*) and Garden thyme (*Thymus vulgaris*), and Fennel flower, seeds (*Nigella sativa*).

The presence of parasites – children's pinworm (*Enterobius vermicularis*), children's round-worm (*Ascaris lumbricoides*) – in the gastrointestinal tract is most often manifested by intense itching in the area of the rectum or, in some cases, vagina. Less common symptoms may include nausea, loss of appetite, irritability, restlessness, and insomnia.

Parasite eggs can survive up to two weeks on clothing, bedding, or other objects. An infection occurs if these eggs are accidentally ingested. Therefore, when using the product, pay extra attention to good personal hygiene (washing hands, etc.) and household hygiene (clean bed linen, etc.).

### Contents in 6 ml of suspension

Field pumpkin ( <i>Cucurbita pepo</i> ), extract from 1.2 g of seeds .....	100 mg
Fennel flower ( <i>Nigella sativa</i> ), seeds.....	20 mg
Elecampane ( <i>Inula helenium</i> ), extract from 65 mg of root .....	15 mg
Summer savory ( <i>Satureja hortensis</i> ), essential oil .....	4.2 mg
Clove ( <i>Syzygium aromaticum</i> ), essential oil .....	2.4 mg
Garden thyme ( <i>Thymus vulgaris</i> ), essential oil.....	0.5 mg

Sorbitol sol. 70% (aqueous solution of sorbitol), Aqua, Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC), Orange oil (*Citrus aurantium* peel oil expressed), Sodium saccharin, Sodium benzoate, Potassium sorbate

**Additives:** silicon dioxide (E 551), magnesium stearate (E 470 b), glycerol (E 422).


**Recommended dosage:** Children: 3–5 years – 3 ml once per day. Children 6–12 years – 6 ml once per day. Use for a period of 5 days, 30 minutes before meals. **Shake well before every use.** Drink enough liquids, ideally unsweetened tea or water. Do not use earlier than 10 days after the end of the last use. **Repeat the treatment after 14 days.**

### Preparation of the Oral Suspension:

a) Take bottle "A" and place it on bottle "B". Pour the solution from bottle "A" into bottle "B".

b) Take bottle "B" and shake it well.

Keep the prepared suspension in bottle "B" at a temperature of 5–12°C.



**Warning:** This product is not suitable for children under the age of 3, or for pregnant or breastfeeding women. This product should not be used where there is known hypersensitivity to any of its ingredients. If you observe a reaction that could be caused by hypersensitivity while using the product (especially hives or reddened skin), immediately discontinue use. If symptoms of hypersensitivity occur, do not use this product again. The product does not impair your ability to drive a motor vehicle or operate heavy machinery.

Keep the unopened product in a dry place at a temperature of 5–25 °C. After opening, keep at a temperature of 5–12 °C and do not use the product for longer than 20 days after the preparation of the suspension. Keep in the original packaging. Keep out of the reach of children. This product is not a substitute for a balanced diet. Do not exceed the recommended daily dosage.

 ENEO Pharmaceuticals s. r. o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice,  
Czech Republic, e-mail: info@eneo.cz

**Content:** 4 g of powder and 60 ml of solution for preparation of oral suspension.

Food Supplement

C-400-217-17-CZ-R3

## HU Vermophyt szírum

A készítmény hatása gyógynövény eredetű aktív anyagok kombinációján alapul. A kézítmény termeszett tők (*Cucurbita pepo*) magjának, örménygyökér (*Inula helenium*) gyökerének, borsikafű (*Satureja hortensis*), szegfűszeg (*Syzygium aromaticum*) és kerti kakukkfű (*Thymus vulgaris*) olajának, valamint feketekömény (*Nigella sativa*) magjának kivonata tartalmazza.

Az előzőkönél férgek – cérmagiliszta (*Enterobius vermicularis*), orsféreg (*Ascaris lumbricoides*) – jelentéje a gyomor- és a bélrendszerben leggyakrabban a végbél vagy a hüvely környékének különöző intenzitású viszketésében nyilvánul meg. Kisebb gyakorisággal fordul elő hányinger, akár érvágytalanság, ingerlékenység, nyugtalanság és álmatlanság.

A paraziták petéi akár két hétag is életben maradhatnak a ruházat, az ágyneműn vagy más tárgyakon. Fertőzés ezeknek a petéknak véletlen yenyelese esetén keletkezik. Ezért már a készítmény használatakor ideje alatt fokozottan ügyeljen a megfelelő személyi higiéniára (kézmosás stb.) és a hárztártási higiéniára (tisztá ágynemű használata stb.).

### Összetevők tartalma a 6 ml szuszpenzióban

Termeszett tők ( <i>Cucurbita pepo</i> ), kivonat, 1,2 g magból.....	100 mg
Fekete kömény ( <i>Nigella sativa</i> ), mag.....	20 mg
Örménygyökér ( <i>Inula helenium</i> ), kivonat 65 mg gyökérből.....	15 mg
Borsikafű ( <i>Satureja hortensis</i> ), illóolaj.....	4,2 mg
Szegfűszeg ( <i>Syzygium aromaticum</i> ), illóolaj.....	2,4 mg
Kerti kakukkfű ( <i>Thymus vulgaris</i> ), illóolaj.....	0,5 mg

Sorbitol sol. 70% (szorbitol vízoldata), Víz (Aqua), Hidroxi-propil-metil-cellulóz (HPMC), Narancsolaj (*Citrus aurantium* peel oil expressed), Szacharin nátriumsója (Sodium saccharin), Nátrium-benzoát (Sodium benzoate), Kálium-szorbát (Potassium sorbate)


**Adalékanyagok:** szilícium-oxid (E 551), magnézium-sztearát (E 470 b), glicerin (E 422).

**Javasolt adagolás:** 3–5 éves gyerekek 1x naponta 3 ml. 6–12 éves gyerekek 1x naponta 6 ml. 5 napon át alkalmazni, 30 percrel az étkezés előtt. **Minden használat előtt felkell rázni.** Bő folyadékkal nyelje le, lehetőleg cukrozatlan teával vagy vízzel. A kézítményt csak az alkalmazást követő 10 nap elteltével használja újra. **14 nap múlva ismételje meg a kezelést.**

### Perorális szuszpenzió elkészítése:

a) Fogja meg az „A” üvegecskét és ezt illeszze rá a „B” üvegecskére. Az „A” üvegecske oldatát öntse át a „B” üvegecskébe.

b) A „B” üvegecskét alaposan rázza fel. Az így elkészített „B” üvegecske szuszpenzióját tárolja 5–12 °C hőmérsékleten.



**Figyelmeztetés:** A jelen készítmény 3 éven aluli gyermekek, terhes és szoptató nők számára nem alkalmás. A készítményt ne használja, ha valamelyik ismert összetevője túlerzsékenységet váltna ki. Ha a készítmény fogyasztásakor túlerzsékenységi reakciót (elsősorban csalánkútiést, bőrvörösödést) tapasztalna, úgy azonnal hagyja abba a használatát. Ha a túlerzsékenység jelei mutatkoznak, ne használja újra a készítményt. A készítmény nem befolyásolja a gépjárművezetési vagy gépezelési képességeket.

A zárt csomagolású készítményt száraz 5–25 °C hőmérsékletű helyen tárolja. Nyitását követően 5–12 °C hőmérsékletű helyen tárolandó, a felbontást követő 20 napon belül fel kell használni. Az eredeti csomagolásban tárolandó. Tartsa távol gyermekktől. A termék nem helyettesíti a váltózatos étrendet. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot.

 ENEO Pharmaceuticals s. r. o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice,  
Cseh Köztársaság, e-mail: info@eneo.cz

**Kiszolgálás:** 4 g por és 60 ml oldat a perorális szuszpenzió elkészítéséhez.

Étrend-kiegészítő

C-400-217-17-CZ-R3