

**Octicide 1 mg/g + 20 mg/g kožní sprej, roztok**

octenidini dihydrochloridum/phenoxyethanolum



**Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

**Co naleznete v této příbalové informaci:**

1. Co je přípravek Octicide a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Octicide používat
3. Jak se přípravek Octicide používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Octicide uchovávat
6. Obsah balení a další informace

**1. Co je přípravek Octicide a k čemu se používá**

Octicide je antiseptický roztok (s dezinfekčními účinky) určený k místnímu použití. Používá se k opakovanému krátkodobému antiseptickému ošetření (ke zničení bakterií a plísň) aplikací na sliznici a na okolní tkáň před diagnostickými výkony v oblasti zevních pohlavních a vylučovacích orgánů, včetně pochvy, vulvy a žaluďu penisu, včetně zavedení močového katétru. Je také používán pro opakované, krátkodobé antiseptické ošetření malých povrchových ran.

Octicide používejte nejdéle po dobu 14 dnů.

**Použití bez doporučení lékaře:**

Bez porady s lékařem se přípravek používá k antiseptickému ošetření malých povrchových ran u dospělých, dospívajících a dětí (jako jsou např. odřeniny, škrábance, drobné řezné ranky, popáleniny a po bodnutí hmyzem).

**Použití na doporučení lékaře:**

Opakované dočasné antiseptické ošetřování popálenin a větších ran, jako jsou proleženiny, vředy na nohou a pooperační jizvy, antiseptické výplachy pochvy a děložního čípku, dezinfekce penisu.

**Použití lékařem:**

Antiseptické ošetření sliznic a přilehlých oblastí kůže před diagnostickými nebo chirurgickými výkony v okolí zevních pohlavních a vylučovacích orgánů, včetně pochvy, vulvy a žaluďu penisu, jakož i před zavedením močového katétru a také pro opakované krátkodobé antiseptické ošetření ran.

**2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Octicide používat****Nepoužívejte přípravek:**

- jestliže jste alergický(á) na octenidin-dihydrochlorid, fenoxylethanol nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Přípravek Octicide nesmí být aplikován do oka.

**Pro lékaře:**

- Octicide nesmí být použit pro výplach břišní dutiny (např. během operace) nebo močového měchýře. Přípravek se nesmí aplikovat na ušní bubínek.

**Upozornění a opatření**

- Před použitím přípravku Octicide se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
- Vyvarujte se podání přípravku Octicide do krevního oběhu, např. v důsledku náhodného vstříknutí.
- Při aplikaci mechanickým rozprašovačem přípravek nevdechujte, abyste zamezili vniknutí přípravku do oblasti hrdla.
- Při použití přípravku Octicide u novorozenců je třeba zvýšené opatrnosti, zejména u těch předčasně narozených. Octicide může způsobit vážné poškození kůže.
- Odstraňte přebytečné množství přípravku a zajistěte, aby roztok nezůstal na kůži déle, než je potřeba (včetně materiálů nasáklých roztokem, které jsou v přímém kontaktu s kůží pacienta).
- Je nutné se vyvarovat náhodnému vniknutí přípravku Octicide do oka. Při náhodném zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody.
- Octicide lze používat při okluzivní léčbě ran.
- Kontakt s aniontovými povrchově aktivními látkami, např. detergenty a běžnými mycími prostředky může negativně ovlivnit účinek tohoto přípravku.

**Další léčivé přípravky a přípravek Octicide**

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech

léčích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat. Neaplikujte Octicide do blízkosti míst ošetřených jinými antiseptickými prostředky na bázi jódovaného povidonu, protože v těchto oblastech může dojít k intenzivnímu hnědému nebo fialovému zbarvení kůže.

**Těhotenství a kojení**

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

**Těhotenství**

V rámci preventivních opatření se během těhotenství vyhněte používání přípravku Octicide.

Pokud to doporučí lékař, lze přípravek Octicide použít během těhotenství od ukončených prvních tří měsíců těhotenství.

**Kojení**

Údaje týkající se použití přípravku Octicide v období kojení nejsou k dispozici. V období kojení nepoužívejte přípravek Octicide v oblasti prsů. Nepoužívejte přípravek bez výslovného doporučení lékaře.

**Plodnost**

Účinky přípravku Octicide na lidskou plodnost nebyly studovány.

**Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Přípravek Octicide nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

**3. Jak se přípravek Octicide používá**

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Octicide se používá neředěný. Nejlepších výsledků se dosáhne aplikací bezprostředně po poranění nebo po prvních příznacích zánětu.

Pokud lékař neurčil jinak, k ošetření ran a poranění aplikujte přípravek na postižené místo jedenkrát denně, ne však déle než po dobu 14 dnů.

Pomocí mechanického rozprašovače aplikujte Octicide na ošetřované místo, aby se zajistilo úplné zvlhčení rány.

U povrchových ran není obvykle nutné žádné krytí obvazem nebo náplastí. Aby se však předešlo možné pozdější infekci v ráně, doporučuje se ránu zakrýt obvazem.

Mějte na paměti, že před jakýmkoli dalším krokem jako je např. zakrytí rány, je třeba počkat aspoň 1 až 2 minuty od aplikace a ránu nechat zaschnout. Abyste dosáhli požadovaného účinku, postupujte pečlivě podle pokynů. Maximální účinek přípravku Octicide je zajištěn do 2 hodin od jeho použití.

Pokud se rána nehojí správně nebo má známky zánětu (zarudnutí, pálení nebo otok v místě aplikace) nebo jiných komplikací při hojení, poraďte se s lékařem. Bez konzultace s lékařem nepoužívejte tento léčivý přípravek déle než 14 dní.

Dosud jsou k dispozici pouze omezené zkušenosti s nepřetržitým používáním po dobu maximálně 14 dnů, proto se přípravek Octicide nemá používat déle než tuto dobu.

**Použití u dětí a dospívajících**

Použití přípravku u dětí i dospívajících je shodné jako u dospělých.

**Pokud jste použil(a) větší množství přípravku Octicide, než jste měl(a)**

Údaje o předávkování nejsou k dispozici. Předávkování přípravkem Octicide po podání v místě aplikace je vysoce nepravděpodobné. Máte-li jakékoliv další dotazy týkající se použití tohoto přípravku, poraďte se s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

**Pokud jste zapomněl(a) použít přípravek Octicide**

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoliv další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

**4. Možné nežádoucí účinky**

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Následující nežádoucí účinky byly pozorovány u přípravku obsahujícího octenidin-dihydrochlorid a fenoxylethanol:

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):  
pálení, zarudnutí, svědění a pocit tepla v místě podání.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):  
kontaktní alergické reakce.

**Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

**5. Jak přípravek Octicide uchovávat**

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Po prvním otevření spotřebujte Octicide do 12 měsíců, s ohledem na dodržení doby použitelnosti uvedené na obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

**6. Obsah balení a další informace****Co přípravek Octicide obsahuje**

Léčivými látkami jsou octenidin dihydrochloridum a phenoxylethanolum. Jeden g vodního roztoku kožního spreje obsahuje octenidin dihydrochloridum 1 mg a phenoxylethanolum 20 mg.

Pomocnými látkami jsou roztok kokamidopropylbetainu 38 % (kokamidopropylbetain, kyselina kokosová, glycerol, čišťená voda, chlorid sodný), natriumglukonát, glycerol 85%, roztok hydroxidu sodného, čišťená voda.

**Jak přípravek Octicide vypadá a co obsahuje toto balení**

Přípravek Octicide je čirý až mírně opalescentní téměř bezbarvý roztok dodávaný v lahvičce z bílého polyethylenu (HDPE) s bílým mechanickým rozprašovačem z polyoxymethylenu (POM), polyethylenu (LDPE) a polypropylenu (PP), obsahující pružinku z nerezové oceli, obsahující 50 ml nebo 250 ml léčivého přípravku.

Velikosti balení jsou 50 ml a 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

**Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:****Držitel rozhodnutí o registraci:**

Neofyt spol. s r.o.  
Pražská 442  
281 67 Stříbrná Skalice  
Česká republika

**Výrobce:**

PROFARMA-PRODUKT, s. r. o.  
Liberecká 801/20  
466 01 Jablonec nad Nisou  
Česká republika

**Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:**

Členské státy	Název přípravku
Česká republika	Octicide
Maďarsko	Octicide
Rumunsko	Octicide
Estonsko	Octicide
Slovenská republika	Octicide
Polsko	Octicide

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 3. 2021



**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnik alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 14 dní nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

**V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je Octicide a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Octicide
3. Ako používať Octicide
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Octicide
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

**1. Čo je Octicide a na čo sa používa**

Octicide je antiseptický roztok (s dezinfekčnými účinkami) pre lokálne použitie. Používa sa na opakované krátkodobé antiseptické ošetrenie, na ničenie baktérií a plesní, aplikáciou na sliznice a príľahlé tkanivá pred diagnostickými zákrokmi v oblasti pohlavných orgánov a konečníka vrátane pošvy, vulvy a žaluďa penisu, rovnako ako aj pred katetrizáciou močového mechúra a tiež na opakované krátkodobé antiseptické ošetrenie malých povrchových rán. Octicide používajte najdlhšie po dobu 14 dní.

**Použitie bez odporúčania lekára:**

Octicide môžete používať bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom na antiseptické ošetrenie povrchových rán u dospelých, dospievajúcich a detí (napr. odreniny, škrabance, drobné porezania, popáleniny a bodnutia hmyzom).

**Použitie na odporúčanie lekára:**

Opakované dočasné antiseptické ošetrenie popálenín, antiseptické výplachy pošvy a krčka maternice, dezinfekcia penisu.

**Použitie lekárom:**

Antiseptické ošetrenie sliznic a príľahlých tkanív pred diagnostickými alebo chirurgickými zákrokmi v oblasti pohlavných orgánov a konečníka vrátane pošvy, vulvy a žaluďa penisu, ako aj pred katetrizáciou močového mechúra a na opakované krátkodobé antiseptické ošetrenie rán.

**2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Octicide**

**Nepoužívajte Octicide:**

- ak ste alergický na oktenidínium-dichlorid, fenoxjetanol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Octicide neaplikujte do oka.

**Pre lekárov:**

- Octicide nepoužívajte pre výplach brušnej dutiny (napr. počas operácie), alebo močového mechúra a neaplikujte na ušný bubienok (membrána stredného ucha, ktorá vibruje v reakcii na zvukové vlny).

**Upozornenia a opatrenia**

- Predtým, ako začnete používať Octicide, obráťte sa na svojho lekára, lekárnik alebo zdravotnú sestru.
- Treba sa vyhnúť preniknutiu Octicidu do krvného obehu, napr. ako dôsledok neúmyselného injekčného podania.
- Počas striekania nevdychujte, aby sa vám nedostal sprej do hrdla.
- Octicide sa má používať s opatrnosťou u novorodencov, hlavne u predčasne narodených detí. Octicide môže spôsobiť vážne poškodenie kože.
- Odstráňte prebytočný liek a uistite sa, že roztok nezostane na koži dlhšie, ako je potrebné (vrátane materiálov nasiaknutých roztokom, ktoré sú v priamom kontakte s pacientom).
- Vyhnite sa použitiu Octicidu do oka. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vypláchnuť veľkým množstvom vody.
- Octicide sa môže používať na okluzívne ošetrenie rán.
- Vyhnite sa kontaktu s aniónovými povrchovo aktívnymi prípravkami, napr. detergentmi a čistiacimi prostriedkami, pretože môžu spôsobiť, že sa oktenidínium-dichlorid stane neúčinným.

**Iné lieky a Octicide**

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nemiešajte Octicide s inými látkami, hlavne neaplikujte Octicide blízko oblastí kože ošetrovaných antiseptickými prípravkami na báze PVP-jódu (komplex povidon-jód), pretože v hraničiacich oblastiach sa môže vyskytnúť silné hnedé až fialové zafarbenie.

**Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť**

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

**Tehotenstvo**

Ako preventívne opatrenie je potrebné sa vyhnúť použitiu Octicidu počas tehotenstva. O použití Octicidu možno uvažovať počas tehotenstva po ukončení obdobia prvých troch mesiacov, ak to odporúča váš lekár.

**Dojčenie**

Nie sú k dispozícii údaje ohľadne aplikácie Octicidu počas dojčenia. Octicide sa nemá aplikovať na oblasť prsníkov dojčiacich matiek. Nepoužívajte Octicide, pokiaľ to jasne neurčí váš lekár.

**Plodnosť**

Účinky Octicidu na ľudskú plodnosť sa neskúmali.

**Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Octicide nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

**3. Ako používať Octicide**

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo vaša zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnik alebo zdravotnej sestry.

Octicide sa odporúča používať v nezriedenom stave. Na zaistenie čo najvyššieho účinku aplikujte Octicide ihneď po poranení alebo pri prvých prejavoch zápalu.

Na ošetrenie rán sa Octicide aplikuje na postihnuté miesto jedenkrát denne po dobu najdlhšie 14 dní, pokiaľ lekár neodporučí inak.

Aplikujte Octicide opakovaným striekaním mechanickým rozprašovačom na ošetrovanú oblasť, až kým nie je úplne navlhčená.

Pre povrchové rany nie je zvyčajne potrebné žiadne prekrytie obvazom alebo náplasťou. Napriek tomu sa odporúča ranu zakryť obvazom, aby sa v budúcnosti zabránilo ďalšej infekcii v rane.

Po použití musíte zakaždým počkať aspoň 1 až 2 minúty pred ďalšími výkonmi v ošetrovanej oblasti. Aby ste dosiahli požadovaný efekt, postupujte dôsledne podľa pokynov. Maximálny účinok sa dosiahne do 2 hodín od jeho použitia.

Informujte svojho lekára alebo lekárnik v prípade, že rana nie je správne zahojená alebo má prejavy zápalu (začervenanie, pálenie alebo opuch). Nepoužívajte tento liek dlhšie ako 14 dní bez konzultácie s lekárom.

Doteraz sú k dispozícii iba obmedzené údaje o nepretržitom používaní počas najviac 14 dní, preto sa Octicide nemá používať dlhšie ako toto obdobie.

**Použitie u detí a dospievajúcich**

Dávkovanie Octicidu je rovnaké u dospelých a detí.

**Ak použijete viac Octicidu, ako máte**

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Pri lokálnom použití je predávkovanie Octicidom veľmi nepravdepodobné. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, opýtajte sa svojho lekára, lekárnik alebo zdravotnej sestry.

**Ak zabudnete použiť Octicide**

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnik alebo zdravotnej sestry.

**4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavujú u každého. Nasledujúce vedľajšie účinky sa pozorovali pri lieku obsahujúcom oktenidínium-dichlorid a fenoxjetanol:

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 osôb):  
Pocit pálenia, začervenanie, svrbenie, pocit tepla.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 osôb):  
Kontaktné alergické reakcie.

**Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnik alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na

Štátny ústav pre kontrolu liečiv  
Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie  
Kvetná ul. 11

SK-825 08 Bratislava 26

Tel: + 421 2 507 01 206

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke [www.sukl.sk](http://www.sukl.sk) v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch.

Formulár na elektronické podávanie hlásení:

<https://portal.sukl.sk/eskadra/>

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

**5. Ako uchovávať Octicide**

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Octicide spotrebujte do 12 mesiacov po jeho prvom otvorení, avšak nie po dátume expirácie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

**6. Obsah balenia a ďalšie informácie**

**Čo Octicide obsahuje**

Liečivá sú oktenidínium-dichlorid a fenoxjetanol. Jeden g dermálneho roztokového spreja obsahuje 1 mg oktenidínium-dichloridu a 20 mg fenoxjetanolu. Ďalšie zložky sú: kokoamidopropylbetaín, roztok 38 % (obsahuje kokoamidopropylbetaín, masť kyseliny z kokosového oleja, glycerín, vodu, chlorid sodný), glukonát sodný, glycerol 85 %, roztok hydroxidu sodného 10 %, čistená voda.

**Ako vyzerá Octicide a obsah balenia**

Octicide je číry až mierne opalizujúci takmer bezfarebný roztok dostupný v bielej polyetylénovej (HDPE) fľaši s bielou manuálnou sprejovou pumpou z polyoxymetylénu (POM), polyetylénu (LDPE) a polypropylénu (PP) s pružinou z nehrdzavejúcej ocele, balený v skladacej škatuli obsahujúcej 50 ml alebo 250 ml lieku.

Veľkosti balenia sú 50 ml a 250 ml.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

**Držiteľ rozhodnutia o registrácii:**

Neofyt spol. s r.o.

Pražská 442

281 67 Stříbrná Skalice

Česká republika

**Výrobca:**

PROFARMA-PRODUKT, s. r. o.

Liberecká 801/20

466 01 Jablonec nad Nisou

Česká republika

**Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:**

Členské štáty	Názov prípravku
Česká republika	Octicide
Maďarsko	Octicide
Rumunsko	Octicide
Estónsko	Octicide
Slovenská republika	Octicide
Poľsko	Octicide

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 01/2021.**

